

# 臨床疑問一覽

## 1 悪心・嘔吐

### 1 制吐薬

●制吐薬は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 52

【臨床疑問 1-1-①】 消化管運動改善薬（メトクロプラミド）は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 53

【臨床疑問 1-1-②】 消化管運動改善薬（ドンペリドン）は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 55

【臨床疑問 1-2】 ハロペリドールは、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 57

【臨床疑問 1-3】 抗コリン薬（スコポラミン臭化水素酸塩）は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 58

【臨床疑問 1-4】 ヒスタミン H<sub>1</sub> 受容体拮抗薬は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 59

【臨床疑問 1-5】 フェノチアジン系抗精神病薬（クロルプロマジン、レボメプロマジン、プロクロルペラジン）は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 60

【臨床疑問 1-6】 非定型抗精神病薬（ペロスピロン、リスペリドン、オランザピン）は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 62

【臨床疑問 1-7】 セロトニン 5HT<sub>3</sub> 受容体拮抗薬は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 64

【臨床疑問 1-8】 コルチコステロイドは、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 66

【臨床疑問 1-9】 ミルタザピンは、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 67

### 2 制吐薬の選択

●化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐に対して、どのように制吐薬を選択するとよいか？ — 71

【臨床疑問 2】 化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の悪心・嘔吐に対して、どのように制吐薬を選択するとよいか？ ————— 71

## 2 悪性消化管閉塞

### 1 消化管ドレナージ

●消化管ドレナージは、がんに伴う消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？

【臨床疑問 3-1】 経鼻胃管による消化管ドレナージは、がんに伴う消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 74

【臨床疑問 3-2】 PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）/PTEG（経皮経食道胃管挿入術）による消化管ドレナージは、がんに伴う消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 75

## 2 薬物療法

●薬物療法は、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 79

[臨床疑問 4-1] コルチコステロイドは、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 80

[臨床疑問 4-2] オクトレオチドは、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 81

[臨床疑問 4-3] プチルスコポラミン臭化物は、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 84

[臨床疑問 4-4] ヒスタミン H<sub>2</sub> 受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬は、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 86

[臨床疑問 4-5] 制吐薬は、がんに伴う手術不可能な消化管閉塞による悪心・嘔吐を改善させるか？ ————— 87

## 3 悪性腹水

●薬物療法・処置は、がん患者の悪性腹水による腹部膨満感を改善させるか？ ————— 90

[臨床疑問 5] 利尿薬は、がん患者の悪性腹水による腹部膨満感を改善させるか？ ————— 90

[臨床疑問 6] 腹腔穿刺ドレナージは、がん患者の悪性腹水による腹部膨満感を改善させるか？ ————— 92

[臨床疑問 7] CART（腹水濾過濃縮再静注法）は、がん患者の悪性腹水による腹部膨満感を改善させるか？ ————— 94

[臨床疑問 8] 腹腔静脈シャント（Denver シャント）は、がん患者の悪性腹水による腹部膨満感を改善させるか？ ————— 95

## 4 便秘

●下剤は、がん患者の便秘を改善させるか？ ————— 98

[臨床疑問 9-1] 浸透圧性下剤（酸化マグネシウム、ラクツロース）は、がん患者の便秘を改善させるか？ ————— 98

[臨床疑問 9-2] 大腸刺激性下剤（センナ、ピコスルファート）は、がん患者の便秘を改善させるか？ — 100

[臨床疑問 9-3] ルビプロストンは、がん患者の便秘を改善させるか？ ————— 101

## 5 食欲不振

●薬物療法は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 103

[臨床疑問 10-1] コルチコステロイドは、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 104

[臨床疑問 10-2] 消化管運動改善薬は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 107

[臨床疑問 10-3] 六君子湯は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 108

[臨床疑問 10-4] エイコサペンタエン酸は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 109

[臨床疑問 10-5] プロゲステロン製剤は、化学療法、放射線治療が原因でないがん患者の食欲不振を改善させるか？ ————— 110