


CQ4 Web 掲載資料

図 3B 鎮静の対象症状 (2) 頻度の少ない身体的苦痛

① 悪心・嘔吐

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



● 持続的深い鎮静 (CDS)






図 3B (つづき)

② けいれん

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静




● 持続的深い鎮静 (CDS)



③ 出血・窒息

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



● 持続的深い鎮静 (CDS)





図 3B (つづき)

④ 死前喘鳴

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



● 持続的深い鎮静 (CDS)





図 3C 鎮静の対象症状 (3) 精神的苦痛

①精神的苦痛

●間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



●持続的深い鎮静 (CDS)






図 3C (つづき)

②精神的苦痛単独

●間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



●持続的深い鎮静 (CDS)




[森田達也. 続 終末期の苦痛がなくならない時, 何が選択できるのか? 医学書院, 2022; p92 (データ提供: 日本緩和医療学会) より作成]


図 3D 鎮静の対象症状 (4) 研究によって扱いが異なる身体的苦痛

① 倦怠感

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静




● 持続的深い鎮静 (CDS)




② Restlessness

● 間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静
または CDS に限らない持続鎮静



● 持続的深い鎮静 (CDS)



〔①右図, ②右図は, 森田達也. 続 終末期の苦痛がなくなる時, 何が選択できるのか? 医学書院, 2022; p91 (データ提供: 日本緩和医療学会) より作成〕

図 4B 治療抵抗性のせん妄，呼吸困難，痛みの頻度の推定（間欠鎮静を含む/広い意味での鎮静または CDS に限らない持続鎮静）

①せん妄




図 4B (つづき)

②呼吸困難





図 4B (つづき)

③ 痛み



[森田達也. 続 終末期の苦痛がなくなる時, 何が選択できるのか? 医学書院, 2022; pp93-5 (データ提供: 日本緩和医療学会) より作成]